

¿ESTÁS EN TRATAMIENTO PARA DIABETES TIPO 2?

Revisa esta información y sigue las recomendaciones



¿QUÉ ES LA DAPAGLIFLOZINA Y LA EMPAGLIFLOZINA?


La **dapagliflozina** y la **empagliflozina** son medicamentos que ayudan a controlar el **azúcar en la sangre**.

Funcionan haciendo que los riñones eliminen el exceso de azúcar a través de la orina, lo que reduce el nivel de azúcar en la sangre de forma natural. Además, **ambos medicamentos ayudan a proteger el corazón y los riñones**.





AL TOMAR ALGUNO DE ESTOS MEDICAMENTOS ¿QUÉ CUIDADOS SE DEBE TENER?



TOMAR AGUA: Al eliminar más azúcar por la orina, también se pierde más líquido, por lo que se recomienda ingerir, al menos, 6 vasos de agua al día.



HIGIENE: Es muy importante cuidar la higiene íntima, porque puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias o genitales.



OBSERVA EL CUERPO: Si hay mareos, sed intensa, dolor o ardor al orinar, es fundamental consultar con el equipo de salud.



NO SUSPENDA EL TRATAMIENTO POR SU CUENTA: Siempre debe consultar a su médico antes de dejar o cambiar la dosis.



SIGA SUS CONTROLES: Combine el medicamento con alimentación saludable, actividad física y controles regulares con el equipo de salud.

REFERENCIAS:

American Kidney Fund. (2024, 28 de agosto). Inhibidores del SGLT2. American Kidney Fund. <https://www.kidneyfund.org/es/tratamientos/medicamentos-para-el-control-de-la-enfermedad-renal/inhibidores-del-sgl2>
Cabrera, S. (2024). Consenso multidisciplinario sobre el uso de inhibidores de SGLT-2 (iSGLT-2) en la práctica clínica chilena mediante metodología GRADE (Resumen Ejecutivo) : Consenso uso iSGLT-2 en Chile con metodología GRADE. Revista Médica De Chile, 152(02). Recuperado a partir de <https://www.revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/view/10906>
Heerspink, H.J. L., et al. (2020). Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 383(15), 1436–1446. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2024816>



@midiabetes




MiDiabetes.cl



@MiDiabetes

www.midiabetes.cl

Fundación
Mi Diabetes
Diabetes en primera persona



www.midiabetes.cl

¿ESTÁS EN TRATAMIENTO PARA DIABETES TIPO 2?

Revisa esta información y sigue las recomendaciones

La dapagliflozina y la empagliflozina son medicamentos seguros y eficaces. Sin embargo, como cualquier otro medicamento, pueden provocar ciertos efectos que deben ser consultados con el equipo de salud.

¿A QUÉ SÍNTOMAS SE LE DEBE PONER ESPECIAL ATENCIÓN?



Signos de cetoacidosis diabética

(Complicación rara, pero que requiere atención inmediata)

Dificultad para respirar Confusión Sensación de mucha sed Vómitos
Dolor abdominal Náuseas Pérdida de apetito Cansancio inusual



Síntomas de deshidratación o presión baja

Mareos o desmayos Sed intensa Sequedad en la boca
Cansancio extremo



Síntomas de infección micótica

Dolor o ardor al orinar Aumento en la frecuencia urinaria
Flujo o secreción genital inusual, picazón o enrojecimiento

REFERENCIAS:

American Kidney Fund. (2024, 28 de agosto). Inhibidores del SGLT2. American Kidney Fund.
<https://www.kidneyfund.org/es/tratamientos/medicamentos-para-el-control-de-la-enfermedad-renal/inhibidores-del-sgl2>
Cabrera, S. (2024). Consenso multidisciplinario sobre el uso de inhibidores de SGLT-2 (iSGLT-2) en la práctica clínica chilena mediante metodología GRADE (Resumen Ejecutivo) :
Consenso uso iSGLT-2 en Chile con metodología GRADE. Revista Médica De Chile, 152(02). Recuperado a partir de
<https://www.revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/view/10906>
Heerspink, H.J.L., et al. (2020). Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 383(15), 1436–1446.
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2024816>



@midiabetes



MiDiabetes.cl



@MiDiabetes

www.midiabetes.cl

Fundación
Mi Diabetes
Diabetes en primera persona

